



NORTH TEXAS ALLERGY & ASTHMA ASSOCIATES

PRESBYTERIAN OFFICE

Professional Building 2
8220 Walnut Hill Lane, Suite 101
Dallas, TX 75231
Tel: (214) 369-1901
Fax: (214) 369-1905
Web: www.texasallergyonline.com

BAYLOR OFFICE

Medical Pavilion 1
4708 Alliance Blvd, Suite 610
Plano, TX 75093
Tel: (972) 596-4383
Fax: (972) 596-4325

ALERGIA DEL LÁTEX

Qué es el latex?

El látex es un líquido lechoso producido por los árboles de goma (*Hevea brasiliensis*). Usando diversos métodos, el látex se puede procesar en una variedad de productos, tales como guantes y globos. Durante la fabricación, los productos químicos están agregado para aumentar la velocidad de curar (vulcanización) y para proteger el caucho del oxígeno en el aire. Productos hechos de mezclas del látex de caucho natural y otros compuestos son muy comunes. En éstos con la alergia del látex, alérgica las reacciones son accionadas lo más a menudo posible por los productos sumergidos del látex. Productos que causan las reacciones pueden incluir comúnmente guantes, los globos y los condones. En raro los casos, la gente que es alérgica al látex pueden también reaccionar a las gomas, borradores, piezas de goma de los juguetes, varios componentes de goma en dispositivos médicos, elástico de goma en los pacifiers de las ropas, o de la alimentación enterrerroscas y. Productos moldeados de difícilmente, el caucho de crepe, tal como soles de zapatos, es poco probable de causar reacciones. Casi todas las pinturas del látex no son un problema puesto que no contienen látex de goma natural.

Qué mecanografía ¿de reacciones alérgicas suceden a la gente alérgica al látex?

Hay dos tipos de reacciones alérgicas al látex. El primer es tipo-retrasar contacto dermatitis, un veneno como la erupcion hiedra con la cual aparecen 12-36 horas después del contacto un producto del látex. Esto aparece lo más comúnmente posible en las manos de la gente que usa los guantes del látex, pero él pueden ocurrir en otras partes del contacto de siguiente del cuerpo con los productos de goma. El dermatitis de contacto es generalmente el resultado de la sensibilización a los productos químicos durante el proceso de goma. Esta forma de alergia no es peligrosa para la vida.

Inmediato (*IgE anticuerpo-mediado*) las reacciones alérgicas son potencialmente la forma más seria de reacciones alérgicas al látex. Como otras formas comunes de alergia, éstas reacciones ocurren en la gente que se han expuesto al látex y tiene previamente se sensibilizado (positivo la'tex-específico del anticuerpo de IgE). Con nueva exposición, los síntomas tales como la comezon, hincharse, estornudo, y la dificultad al respirar pueden ocurrir. Raramente, a la persona experimentará síntomas peligrosos para la vida. Esta reacción alérgica severa se llama los anaphylaxis. Si no es tratado inmediatamente, puede ser fatal. El peligro más grande de reacciones severas ocurren cuando el látex viene en contacto con áreas húmedas del cuerpo o superficies internas durante cirugía, porque más de el alergénico se puede absorber rápidamente en el cuerpo. El látex puede también convertirse síntomas respiratorios aerotransportados y de la causa. El uso de los guantes no-pulverizados del látex o (vinilo, nitrilo) los guantes sintéticos reducen el riesgo de estas reacciones.

Quién ¿desarrolla alergia del látex?

Ciertos grupos de los individuos que se exponen con frecuencia al látex esté en el alto riesgo para reacciones alérgicas inmediatas que se convierten. Individuos con spina bífido (a problema trasero congénito) y éstos con los problemas congénitos de la zona urinaria que las cirugías múltiples de la necesidad se parecen tener un riesgo de el casi 50%. Trabajadores del cuidado médico y otros trabajos requieren guantes del látex que se usan o trabajando alrededor de ellos tienen un riesgo de el cerca de 10%. Otros que pueden estar en el riesgo creciente son los que han tenido muchos procedimientos médicos o quirúrgicos, dando por resultado la exposición repetida al látex guantes. Los trabajadores de goma de la industria también están en el riesgo creciente. El riesgo de la sensibilización al látex puede ser tan alta como el 6%.

Qué alimentos reaccionan al látex?

Gente con la alergia del látex puede experimentar una reacción alérgica a algunos alimentos que contengan algunas de las mismas proteínas alergénicas que éstos en látex. Esta reacción (reactividad cruzada) puede ser accionado por los plátanos, los aguacates, el kiwi y las castañas.

Comor hacer el diagnostique de la alergia del latex?

El primer paso en diagnosticar la alergia del látex es conocimiento del problema. Visite a su doctor si usted piensa que usted puede tener una alergia del látex. Después de tomar una historia detallada y examinándole, decidiremos si las pruebas de diagnóstico adicionales para la alergia del latex que son necesarios. Si usted es alérgico al látex, usted debe evitar el contacto con productos naturales del látex de goma.

Cómo hácerle para tartar a los pacientes con alergia del látex?

Informe a su familia y profesionales del cuidado médico, patrón y personal de la escuela sobre su alergia. Usted puede también desear usar una pulsera o un collar especial que notifique otras de su alergia. También nos determinaremos si usted debe llevar adrenalina inyectable (epinephrine) para proporcionar inmediato, tratamiento de la emergencia en caso que usted experimente una reacción alérgica severa.

Usted puede intentar substituir (vinilo o nitrilo) los guantes sintéticos para los guantes del látex, aunque alomejor no pueden funcionar igual en algunas situaciones. Si usted tiene látex significativo los síntomas respiratorios de la alergia de inhalar las partículas del látex, usted necesita evitar áreas donde los guantes pulverizados se utilizan con frecuencia.